

Bedömning

År

Biodlare	Namn	Bigård	Typ	Namn	Kupa
Drottning	Märkt	Övervint. egna bin	Ja/nej	Medelskörd i bigård	Kg
Parning	Vingklippt	Rammått i y- rum	Ja/nej	Antal samhällen	
Moder	Tillsatt	Rammått i s-lådor	Datum		



5 Honung

Datum	Kg	Datum	Kg	Datum	Kg	Datum	Kg	Datum	Kg	Summa kg till kolumn 5 i R-tal
-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	--------------------------------

6 Utrensning Frysmetoden

Datum	% utrensat	Datum	% utrensat	Utrensat i % medeltal	7 Nosema	Datum	Infektionsgrad
-------	------------	-------	------------	-----------------------	----------	-------	----------------

Bedömning Nr	Bedömning Datum	1 Temperament /Kakfasthet	2 Svärmtrogthet	3 Fruktksamhet	4 Kalkyngel	5 Honung	8 Varroatolerans / VSH	9 Färg drönare	10 Färg arbetsbi	Övriga noteringar:
1										
2										
3										
Sammanställt värde						R-tal				

Anvisningar: Bedömningar görs vid minst 3 skilda tillfällen, för säkrare värde, sprid gärna tillfällen jämnt över hela dragsäsongen, och två tillfällen med sämre väderförhållanden.

Egenskaperna 1- 4 bedöms vid varje tillfälle, övriga bedöms när så är möjligt. Egenskaperna: **6. Utrensning**, **7. Nosema** och **8 Varroatolerans** anges om särskilda prov utförts för dessa.

Genomgående för egenskaperna är 5-gradig skala, utom för de egenskaper som anges särskilt nedan. **9. Färg drönare** och **10. Färg arbetsbi** ifylls om så anses ha betydelse.

OBS! Vid sammanställning av värden gäller inte generellt genomsnittligt värde utan ibland lägsta värde som uppnåtts vid de tre bedömningarna. Vilket värde som ska användas anges nedan efter förkortningen "SV"

1. Temperament/ kakfasthet

- 5. mycket lugna/sitter stilla
- 4. tämligen lugna/rörligare
- 3. normala/ganska rörliga
- 2. irriterade /rörliga
- 1. sticker oprovocerat/mycket rörliga
- SV: Medelvärde

2. Svärmtrogthet

- 5. inga bestiftade celler
- 4. bestiftade celler, ingen svärmning
- 3. bestiftade cellkoppar, ett angrepp
- 2. bestiftade cellkoppar, flera angrepp
- 1. svärmning trots åtgärder
- SV: Lägsta värde

3. Fruktbarhet

- 5. stora yngelytor, birikt hela säsongen
- 4. skott i mycket lite omfattning
- 3. normalt
- 2. dålig fruktsamhet
- 1. omsätter all nektar i yngel
- SV: Medelvärde

4. Kalkyngel

- 5. inget kalkyngel observerat
- 4. enstaka drönarceller
- 3. enstaka arbetarceller
- 2. många kalkyngelceller
- 1. kalkyngel i merparten celler
- SV: Medelvärde

5. Honungsskörd

- Relativtalet används.
- En kupas totalskörd divideras med bigårdens medel.
- Kupa som har bigårdens medel = 1,0.
- Ex. 50 kg = medel i bigård och 1,0, eller 100%.
- Ett samhälle ger 60 kg, vilket blir 1,2 eller 120%.
- 50% av medelskörd = 0,5.

6. Utrensning

- Frysmetoden max 24 tim. Två provtillfällen medeltal i % anges.

7. Nosema

- 5. inga sporer
- 3. 1-5 sporer (0,5-2 milj. sporer/bi)
- 1. 6-40 sporer (>5 milj. sporer/bi)
- SV: Lägsta värde
- För säkert värde leta över täckglaset
- Antal sporer i förstoring 400 ggr

8. Varroatolerans

- Bedöms enligt den för tillfället aktuella metoden.

9. Färg drönare

- 5. helt mörka
- 3. bronsfärgade
- 1. gul rand eller randiga

10. Färg arbetsbi

- 5. helt likformiga
- 3. något varierade
- 1. mycket olika färg

Anteckningar
